



Explos-Nature  
ÉDUCATION-RECHERCHE



## Le Pipit d'Amérique sous la loupe de l'OOT

Les journées fraîches se succèdent maintenant à Tadoussac, mais des observateurs de partout au Québec persistent et assistent, certaines journées, à des défilés aériens spectaculaires. Au courant des derniers jours, plusieurs groupes d'oiseaux se sont posés à répétition sur les dunes. Les observateurs ont notamment pu admirer le comportement d'une espèce grégaire : un hochement de queue et un mouvement de tête répétitif. Pas de doute, il s'agit bel et bien de Pipits d'Amérique. L'habitat des dunes, un milieu ouvert avec une végétation limitée, est très propice pour cette espèce qui fréquente aussi les rivages rocheux et les carrières de gravier durant sa migration.




Le Pipit d'Amérique, de la toundra au sud de l'Amérique du Nord en passant par Tadoussac

© Samuel Denault

Peu observé dans certains secteurs du sud du Québec, le Pipit est noté en bon nombre à l'OOT. Depuis l'ajout

des passereaux aux relevés visuels en 1996, plus de 1800 individus sont dénombrés en moyenne sur une base annuelle (voir graphique). Mais l'équipe de l'Observatoire désirait en apprendre davantage sur cette espèce peu étudiée à l'échelle canadienne et qui niche en toundra et sur certains hauts sommets du sud du Québec. Le principal questionnement concernait la productivité de l'espèce et la phénologie de la migration chez les juvéniles et les adultes. Or, les relevés visuels ne pouvaient être d'une grande utilité pour étudier ces aspects.

Comme l'an dernier, la station de baguage de l'OOT est venue jouer son rôle auxiliaire. L'OOT a entrepris le 13 septembre dernier un programme de capture ciblée à partir de deux enceintes de filets japonais combinées



à un système d'appel diffusant le cri de l'espèce. Les résultats sont concluants : jusqu'à maintenant, 65 individus ont été capturés, soit 32 juvéniles, 29 adultes et 4 inconnus. Du côté des relevés visuels, 1068 Pipits ont été dénombrés depuis le 24 août. Il sera intéressant de voir si le nombre d'oiseaux surpassera le record établi l'an dernier.

**Relevés visuels** Les passages de rapaces se succèdent aux dunes. Les 21 et 22 septembre, 842 et 772 oiseaux de proie ont été dénombrés respectivement. Depuis le 24 août, 6502 rapaces

ont été notés, ce qui est légèrement inférieur à la moyenne enregistrée pour la même période entre 1993 et

2007, qui est de 6779 individus. Pour le moment, la majorité des rapaces identifiés appartiennent à une seule espèce, l'Épervier brun, qui compte déjà 3367 migrateurs. La diversité des espèces est aussi en augmentation avec la venue des trois premiers Aigles royaux de la saison et les premiers bons mouvements de Buses à queue rousse (359 individus au cours des deux dernières semaines).

Pour ce qui est des passereaux, la journée du 25 septembre a été marquée par un mouvement de 737 Tarins des pins vers le nord-est, alors que 188 Mésanges à tête brune ont pris la direction du sud-ouest. Un mouvement massif de Mésanges à tête brune (vers l'ouest) a aussi été signalé par Germain Savard et Claudette Cormier à Saint-Fulgence. Plus de 2000 individus ont été aperçus les 22 et 23 septembre dernier.

En ce qui concerne les oiseaux aquatiques et pélagiques, nos recenseurs ont pu noter quelques belles raretés. Depuis le 12 septembre, 5 Goélands bruns, 6 Labbes parasites et 1 Eider à tête grise, une première à l'OOT, ont été observés à partir du belvédère des dunes. Quelques bons passages de Bernaches du Canada et d'Oies des neiges ont aussi été observés pour un total de 2229 et de 1088 individus respectivement.

Dénombrement des espèces prioritaires à l'OOT		
Espèce	Semaines 4 et 5 du 12 au 25 sept.	Total 2008
Bec-croisé bifascié	61	2170
Sizerin flammé	0	0
Tarin des pins	1394	1465
Durbec des sapins	0	0
Roselin pourpré	44	188
Gros-bec errant	21	40
Jaseur d'Amérique	1138	3121
Jaseur boréal	2	2
Pic à dos rayé	1	1
Pic à dos noir	8	13
Mésange à tête noire	61	99
Mésange à tête brune	355	365
Quiscale rouilleux	102	134
Alouette hausse-col	711	753
Pipit d'Amérique	863	1068
Merle d'Amérique	80	146

Recenseurs : Samuel Belleau et Samuel Denault

**Station de baguage** L'équipe de baguage de nuit est loin de s'ennuyer en cette saison 2008. La dispersion annoncée de la Nyctale de Tengmalm se déroule à un rythme surprenant. En date du 25 septembre, 81 Nyctales de Tengmalm ont été capturées. Si l'on compare ce résultat avec les données de 2004, année record pour cette espèce, on peut prévoir que 2008 sera le théâtre d'une dispersion encore plus massive. En effet, en 2004, où 231 Nyctales de Tengmalm avaient été baguées, 42 individus avaient été capturés à pareille date. Le nombre de captures effectuées jusqu'ici est donc de 93 % supérieur à cette donnée. Si la phénologie de la migration de l'espèce est respectée, le mois d'octobre sera une excellente période pour découvrir ces magnifiques chouettes. Avis aux intéressés!

Nombre de nyctales capturées et baguées		
Espèce	Semaines 4-5 (du 12 au 25 sept.)	Saison 2008
Petite Nyctale	63	72
Nyctale de Tengmalm	67	81

Bagueurs : Antonin Bénard et Mathieu Tremblay

Sur ce, toute l'équipe vous souhaite de belles observations!

**Équipe de rédaction** : Pascal Côté (auteur, [pascal.cote.oot@gmail.com](mailto:pascal.cote.oot@gmail.com)) et Andrew P. Coughlan (éditeur et traducteur, version anglaise)

En 2008, l'OOT bénéficie de l'appui du Service canadien de la faune et du Programme de stages pour les jeunes Horizons Sciences d'Environnement Canada, du parc national du Saguenay, du ministère des Ressources naturelles et de la Faune, du Parc marin Saguenay-Saint-Laurent, de la Fondation de la faune du Québec, de Protection des oiseaux du Québec, du Centre de la conservation de la faune ailée, du CLD de la Haute-Côte-Nord, du Baillie Birdathon d'Études d'oiseaux Canada, du Fonds de développement OOT d'Explos-Nature et du Fonds des amis de l'OOT.