L'habitat de repos des chauves-souris du genre *Myotis* en forêt boréale aménagée

François Fabianek¹, Anouk Simard², André Desrochers¹

1. CEF, Université Laval, Département de Foresterie et de Géographie

2. Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Introduction

- Histoire de vie d'une chauve-souris « résidente »

Introduction

- Histoire de vie d'une chauve-souris « résidente »

Introduction

- Les arbres pour les chauves-souris:
Habitat de repos, mise-bas, pouponnière

(Barclay & Kurta, 2007)

- Objectifs principaux:
Y a-t-il une sélection pour un habitat particulier ?
Cet habitat est-il limité en forêt boréale ?

Introduction

- Un type d'arbre en particulier ?
Généralement large et haut
Présence d'écorce
Stade de dégradation
(Jung *et al.* 2004,
Kalcounis *et al.* 2005
Milles *et al.* 2006)

Introduction

- Un type d'arbre en particulier ?

Généralement large et haut

Présence d'écorce

Stade de dégradation

(Jung *et al.* 2004,

Kalcounis *et al.* 2005

Milles *et al.* 2006)

- Le peuplement forestier ?

Gîtes potentiels alentours

Faible densité d'arbres

Ouverture de la canopée

Forte radiation solaire

(Kalcounis-Rueppell *et al.* 2005,

Reckardt & Kerth 2007,

Garroway & Broders 2008)

Objectif 1– Sélection de l'habitat de repos

- **Sous-objectif:**
Déterminer les variables d'importance dans la sapinière
- **Points abordés:**
Capture de chauves-souris à la forêt Montmorency
Résultats à l'échelle de l'arbre et du peuplement
- **Hypothèses:**
 1. Hypothèse de la disponibilité en nichoirs naturels
 2. Hypothèse du microclimat
 3. Hypothèse de l'accessibilité / visibilité
 4. Hypothèses de la disponibilité et du microclimat
 5. Hypothèses de la disponibilité et de l'accessibilité

Objectif 1– Sélection de l’habitat de repos

- Captures à la Forêt Montmorency (FM)

23 mâles capturés:

12 jamais retrouvés ou au sein d'habitations

5 *Myotis lucifugus* (MYLU)

6 *M. septentrionalis* (MYSE)

Vie des émetteurs: 9 ± 2 jours

Total de 40 arbres-gites (5 ± 2)

Changement tous les 2 ± 1 jours

Objectif 1– Sélection de l’habitat de repos

- Habitats sélectionnés vs. points aléatoires:

Sur l’arbre:

Essence, hauteur, DHP

% d’écorce restante

Classes de dégradation (1 à 7)

Dans le peuplement:

Décompte au prisme

DHP + classes de dégradation

Couverture latérale à 2 et 16 m

Objectif 1– Sélection de l'habitat de repos

- Données LiDAR (Light Detection And Ranging) pour générer d'autres variables à l'échelle du peuplement:

Hauteur moyenne du peuplement (m)
Surface des trouées (m^2) à 2 et 16 m
Niveau d'insolation ($MJ / m^2 / jour$)

Objectif 1– Sélection de l'habitat de repos

- Les chauves-souris préfèrent les chicots

Objectif 1– Sélection de l'habitat de repos

- Les chauves-souris préfèrent les chicots

Objectif 1– Sélection de l'habitat de repos

- Arbres utilisés par les mâles à la FM:

Pas de sélection de l'essence

32 sapin baumiers (*Abies balsamea*)

3 épinettes blanches (*Picea glauca*)

5 bouleaux à papier (*Betula papyrifera*)

Objectif 1– Sélection de l'habitat de repos

- Hypothèses: 20 modèles alternatifs
 1. Hypothèse de la disponibilité en nichoirs naturels
Diamètre + % écorce + chicots
 2. Hypothèse du microclimat
Diamètre + insolation
 3. Hypothèse de l'accessibilité
Hauteur + % trouée + couverture latérale
 4. Hypothèses de la disponibilité et du microclimat
Diamètre + insolation + % écorce + chicots
 5. Hypothèses de la disponibilité et de l'accessibilité
Diamètre + % trouée + hauteur + % écorce + chicots

Objectif 1– Sélection de l’habitat de repos

- Classement des GLMMs avec AICc

Distribution binomiale

Effet aléatoire: choix individuel

Meilleur GLMM (effets fixes):

Espèce de
chauve-souris + chicots + trouées à 2 m + hauteur + DHP

	Odd ratio	95% IC	<i>P</i> (z)
MYSE	2.0	0.4 ; 10.2	0.41
Chicots (<i>n</i>)	1.5	1.2 ; 1.9	<0.001
Trouées à 2 m (%)	1.1	1.0 ; 1.3	0.003
Hauteur (m)	1.5	1.1 ; 2.0	0.006
DHP (cm)	1.3	1.1 ; 1.5	0.004

Objectif 1– Sélection de l'habitat de repos

- Conclusion

Les chicots sélectionnés: fournissent des nichoirs accessibles pour les mâles

Plus de trouées, mais pas d'insolation!

Besoins différents des femelles reproductives

- Recommandations

Coupes partielles avec rétention de chicots

Petites parcelles de 0,1 ha comprenant 7 chicots avec DHP ≥ 10 cm

Objectif 2– Habitat de repos potentiel

- **Sous-objectifs:**
Proportion et localisation des habitats potentiels
(aspect limitant)
Différences spécifiques
- **Points abordés:**
Importance des variables
Cartes d'habitats potentiels
- **Prédictions:**
 1. Les habitats potentiels différents pour les deux espèces du genre *Myotis*
 2. Ces habitats sont faiblement représentés dans le paysage forestier

Objectif 2– Habitat de repos potentiel

Objectif 2– Habitat de repos potentiel

Objectif 2– Habitat de repos potentiel

- Random Forest: algorithme de classification
5000 arbres de décision
Permutation aléatoire des variables prédictives

Importance des variables prédictives
Prédictions = cartes d'habitat potentiel

Objectif 2– Habitat de repos potentiel

Importance des variables

Objectif 2– Habitat de repos potentiel

- Conclusion

Les sommets du massif offrent un moindre potentiel

Chevauchement pour les 2 espèces ($D = 0,82$)

La sapinière apparaît plus propice pour MYSE

Conclusion générale

- **Sélection d'un habitat en particulier ?**
Chicots, arbres avec écorce exfoliante ou cavités
Habitat ouvert, proximité des habitats de chasse (?)
- **Les habitats potentiels sont-ils limités ?**
Relativement abondants, pas les chauves-souris!
Les arbres vivants à cavité ? Les femelles ?
- **Quelques recommandations...**
Rétention de chicots
Laisser / créer des îlots de 0,1 ha comprenant min. 7 chicots
Augmenter la proportion de parcelles résiduelles surannées

Références

- Broders and Forbes. 2004. Interspecific and intersexual variation in roost-site selection of Northern Long-eared and Little Brown Bats in the Greater Fundy National Park ecosystem. *Journal of Wildlife Management* 68(3):602-610.
- Garroway and Broders. 2008. Day roost characteristics of northern long-eared bats (*Myotis septentrionalis*) in relation to female reproductive status. *Ecoscience* 15(1):89-95.
- Jung *et al.* 2004. Roost site selection by forest-dwelling male *Myotis* in central Ontario, Canada. *Forest Ecology and Management*. 202(1-3):325-335.
- Milles *et al.* 2006. Multi-Scale Roost-Site Selection by Evening Bats on Pine-Dominated Landscapes in Southwest Georgiano. *Journal of Wildlife Management* 70(5):1191-1199.
- Park and Broders. 2012. Distribution and Roost Selection of Bats on Newfoundland. *Northeastern Naturalist* 19(2):165-176.
- Reckardt and Kerth. 2007. Roost selection and roost switching of female Bechstein's bats (*Myotis bechsteinii*) as a strategy of parasite avoidance. *Oecologia* 154(3):581-588.

Fonds de recherche
sur la nature
et les technologies

Québec

Développement durable,
Environnement,
Faune et Parcs

Québec

Centre for Forest Research

UNIVERSITÉ
LAVAL

Nous remercions les
professionnels de
recherche du CEF, les
techniciens du MFFP, le
Biodôme, les collègues
et les assistants de
terrain...